## ピペラシリンナトリウムの「使用上の注意」の改訂について

成分名	成分名	該当商品名(承認取得者)
該当商品名	ピペラシリンナトリウム	ペントシリン注射用 1g、同注射用 2g、
		   同静注用 1g バッグ、同静注用 2g バッ
		グ(富山化学工業株式会社)他
効能・効果	<適応菌種>	
	ピペラシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球	
	菌属、大腸菌、シトロバクター属、肺炎桿菌、エンテロバクター属、	
	セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシ	
	ア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、バクテロイデス属、プレボテラ属	
	(プレボテラ・ビビアを除く)	
	<適応症>	
	敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次	
	感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内	
	感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎	
改訂の概要	「重大な副作用」の「中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群」の	
	項に「急性汎発性発疹性膿疱	症」を追記する。
改訂の理由及び調査	本剤及びタゾバクタム・ピペ	『ラシリン水和物の国内症例が集積したこ
の結果	とから、専門委員の意見も踏まえた調査の結果、改訂することが適切	
	と判断した。	
直近3年度の国内副	「急性汎発性発疹性膿疱症」0例	
作用症例の集積状況		
【転帰死亡症例】		